

+

راهنمای کشوری

مبارزه با هاری

(۱۳۸۳)

گردآورندگان به ترتیب حروف الفبا:

مرکز مدیریت بیماری‌ها:
انستیتو پاستور ایران:
دکتر جمال شریفیان
دکتر سوسن سیمانی
دکتر محمد رضا شیرزادی
دکتر احمد فیاض
دکتر بدخشنان هوشمند

با همکاری:
دکتر محمد زینلی - نوشین عقیلی

(زیر نظر کمیته فنی کشوری هاری)



+

+

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت سلامت
مرکز مدیریت بیماری‌ها
اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان



راهنمای کشوری مبارزه با هاری (۱۳۸۳)/ گردآورندگان: همکاران شاغل در مرکز مدیریت بیماری‌ها، انتیتو پاستور ایران؛ [برای] وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت سلامت، مرکز مدیریت بیماری‌ها، اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان، زیر نظر کمیته فنی کشوری هاری.
تهران: مرکز نشر صدای ۱۳۸۳.

ISBN: 964-359-117-4

فهرستنويسي براساس اطلاعات فبا.
كتابنامه، ص ۵۶

۱. هاری الف. ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مرکز مدیریت بیماری‌ها.
- ب. انتیتو پاستور ایران. ج. اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان.
- د. کمیته فنی کشوری هاری. هـ. عنوان

RC ۱۴۸ / ۲
۶۱۴/۵۶۳

كتابخانه ملي ايران

م ۸۳-۳۵۳۳۸

مرکز نشر
۸۵۵۳۴۲۹ و ۸۵۵۳۴۰۳
دورنگار: ۸۷۱۳۶۵۳

مرکز مدیریت بیماری‌ها

راهنمای کشوری مبارزه با هاری (۱۳۸۳)

گردآورندگان به ترتیب حروف الفبا:

مرکز مدیریت بیماری‌ها:

دکتر جمال شریفیان - دکتر محمدرضا شیرزادی - دکتر بدخشان هوشمند

انتیتو پاستور ایران:

دکتر سوسن سیمانی - دکتر احمد فیاض

با همکاری:

دکتر محمد زینلی - نوشین عقیلی
زیر نظر کمیته فنی کشوری هاری

+

+

+

خدمات چاپ و نشر: مرکز نشر صدا
طرح روی جلد: هومن مردان پور
صفحه آرای: لیلا پورفولادی
نوبت چاپ: اول (۱۳۸۳)
تعداد: ۵۰۰ نسخه
شابک: ۹۶۴-۳۵۹-۱۱۷-۴ ISBN: 964-359-117-4
«حق چاپ برای مرکز مدیریت بیماری‌ها محفوظ است.»

+

سرآغاز

مرکز مدیریت بیماری‌های کشور که مسئولیت مهم تدوین راهنمای علمی - عملیاتی کشور را به عهده دارد، در راستای انجام وظایف سنگین خود در جهت تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، ناگزیر است از سیستم‌های مراقبت اپیدمیولوژیک، پیشگیری اپیدمیولوژیک، گزارش‌دهی، همه‌گیری‌شناسنامه، آموزش، مشاوره و روش‌های مختلف پیشگیری بهره‌گیرد. این مرکز جهت دستیابی به اهداف خود به عشق و فداکاری انسان‌های علاقه‌مند، به علم و دانش اساتید دلسوز، به خرد و اندیشه عارفانه محققان خاموش و پر کار، و به عمل هنرمندانه عاملان بی‌تكلف، هم‌مواره وابسته است. این راهنمای حاصل تجدیدنظر و بازنگری دستورالعمل اجرایی کشور است که با استفاده از آخرین توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت و کتاب‌های مرجع و سایر اطلاعات موجود و نظریه‌های اعضای کمیته فنی با مشارکت همکاران اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان، و همچنین اساتید و محققان محترم بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری WHO در اسستیتو پاستور تبیه و تدوین گردیده و به تأیید کمیته فنی کشوری هاری رسیده است. ضمن تشکر از این عزیزان و همچنین سایر اعضای کمیته فنی هاری آقایان دکتر ندیم، دکتر رضانی، دکتر نسوی، دکتر خرازیان، دکتر بابایی، دکتر نیکخواه و سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی، امید است با دقت‌نظر و توجه خاص و حمایت مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی و سایر مسئولان اجرایی در سطح دانشگاه‌ها و شهرستان‌ها و با هماهنگی بین‌بخشی و همکاری دیگر نهادها، شاهد اجرای این دستورالعمل و رسیدن به هدف نهایی باشیم.

مرکز مدیریت بیماری‌ها از نقطه‌نظرهای پیشنهادها و انتقادهای تمام صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران آموزشی، پژوهشی و اجرایی امور بهداشتی‌درمانی استقبال می‌کند؛ بنابراین خواهشمند است این مرکز را در جهت بهبود کیفی متون علمی و پژوهشی یاری فرماید.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۹	پيش گفتار
۱۱	مقدمه و اهميت بيماري
۱۲	عامل بيماري
۱۳	راههای سرایت بیماری به حیوان و انسان
۲۰	علائم بیماری در حیوان
۲۱	علائم بالینی در انسان
۲۲	تشخيص
۲۳	تعاریف و طبقه‌بندی موارد
۲۴	درمان
۳۳	کنترل و پیشگیری هاري در ايران
۵۱	منابع
۵۳	فرم گزارش ماهیانه اطلاعات موارد حیوان گزیدگی ...
۵۴	فرم بررسی انفرادی بیماری هاري
۵۵	نمونه دفتر پیگیری موارد حیوان گزیده
۵۶	كارت درمان پیشگیری هاري

+

پیش گفتار

بیماری هاری یکی از مهمترین بیماری‌های مشترک بین حیوان و انسان است که در خیلی از مناطق جهان شایع بوده و در ایران نیز یک اولویت مهم بهشمارمی‌آید. با توجه به درصد کشنده‌گی بالا (صد درصد)، برنامه مراقبت و پیگیری تمام آسیب‌دیدگان حیوان گزیده به منظور جلوگیری از ابتلاء هاری با جدیت خاص توسط عوامل اجرایی مربوط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در سطوح مختلف، به ویژه در مراکز بهداشت شهرستان‌ها در حال اجرا است و خوشبختانه با وجود افزایش موارد حیوان گزیدگی انسانی، موارد ابتلاء انسان به هاری کاهش یافته است.

این کاهش می‌تواند ناشی از بیبود سیستم مراقبت در کشف به موقع حیوان گزیده‌ها و درمان پیشگیری به موقع آن‌ها باشد. البته بایستی برای رسیدن به هدف نهایی، یعنی نبود بیماری هاری انسانی، در جهت بالابردن سطح آگاهی جامعه و کارکنان فنی بخش بهداشت و درمان، تقویت سیستم مراقبت و هماهنگی‌های بین‌بخشی تلاش‌های بیشتری به عمل آید.

«گردآورندگان»

1

عامل بیماری

+

+

مقدمه و اهمیت بیماری

هاري یک بیماری عفونی حاد(آنسفالیت) و کشنده ویروسی است که به دو شکل تحریکی(هاري خشمگین) یا فلجنی(هاري ساکت) ظاهر می شود. این بیماری مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده، انسان و سایر حیوان های خونگرم پستاندار، به طور تصادفی و اغلب از طریق حیوان گزیدگی به آن مبتلا می شوند.

اهمیت بیماری هاري به دلایل زیر است:

۱. میزان کشنده‌گی بالا(صددرصد)، به طوری که پس از ظهور علائم بالینی چه در انسان و چه در حیوان، قابل درمان نبوده و بیمار محکوم به مرگ خواهد بود.
۲. افزایش روند موارد حیوان گزیدگی در انسان، به طوری که به ناجار سالانه مبالغه زیادی صرف خرد سرم و واکسن ضد هاري جهت درمان پیشگیری آسیب دیدگان می شود.
۳. تلفات دام و خسارت های اقتصادی ناشی از این بیماری که در دامها ایجاد می شود.

روند سالانه حیوان گزیدگی در ایران رو به افزایش است؛ به طوری که در ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت، این میزان از ۳۵/۱ مورد در سال ۱۳۶۶ به ۱۵۱ مورد در سال ۱۳۸۱ رسیده است. براساس بررسی های آماری در استان های مختلف، بیش از ۸۵٪ از موارد حیوان گزیدگی توسط سگ

افزايش ميزان حيوان گزيدگي در انسان، طی سال هاي اخير را می توان به دليل مختلفي مربوط دانست. از جمله، اجرای برنامه هاي آموزشي در جهت بالابردن سطح آگاهي مردم در زمينه خطرهای ناشی از گازگرفتن توسط حيوان و اهميت درمان پيشگيري به موقع در عدم بروز علائم هاري در انسان از يك طرف و كاهش فعاليت کميته هاي اتفاف سگ هاي ولگرد از طرف ديگر است.

عامل بيماري

عامل هاري، ويروسی از گروه RNA و نروتروپ متعلق به رابدوویروس ها و جنس لیساویروس ها است. تمام انواع اين جنس شbahت آنتیژنيک دارند و با استفاده از آنتی بادی منوکلونال به گروه هاي فرعی متعددی تقسیم شده که هر يك در مناطق جغرافيايی ویژه ای مشاهده می شوند. رابدوویروس ها حدود ۱۸۰ نانومتر درازا و ۷۵ نانومتر پهنا دارند که شبیه فشنگ بوده، در يك انتهای مسطح و در انتهای ديگر محدب و از دو قسمت زير تشکيل شده است:

۱. قسمت مرکزي

شامل ريبونوكليوپروتين فشرده ماريچي با ژنوم RNA بوده که به وسیله غشای خارجي^۱ احاطه شده است. در اين قسمت دو پروتين ديجر شامل فسفوپروتين و پلي مراز^۲ نيز به ريبونوكليوپروتين ها متصل است.



شكل شماره ۱: نمای طولی ویروس هاري

1. Envelope
2. Large Protein

1
عامل بيماري

اتفاق می افتد که بیشتر این موارد به سگ های خانگی و سگ گله اختصاص دارد و متأسفانه علت اصلی آن، عدم قلاده گذاری^۱ است.

1
مقادمه و اهمیت بیماری


۱. منظور از قلاده گذاري استفاده از وسیله قلاده جهت مبارزه حيوان و مراقبت هاي بيداشتی از قبل و اکسپلاسيون هاري و غيره و آموزش صاحب سگ است.

از طریق پوست سالم، هاری سرایت‌پذیر نیست؛ ولی از راه کوچکترین خراش یا زخم در پوست، این بیماری منتقل می‌شود.

1
عامل بیماری

۲. غشای خارجی
از جنس لیپوپروتئین و دارای دو پروتئین ماتریکس و گلیکوپروتئین است. گلیکوپروتئین‌ها بر جستگی‌های سوزنی‌شکلی هستند که محکم روی غشای خارجی چسبیده‌اند و در اتصال ویروس به سلول میزبان و تولید آنتی‌بادی خنثی‌کننده نقش دارند.

حلال‌های چربی، ویروس هاری را از بین می‌برند. این ویروس تحت تأثیر خشکی و حرارت 56°C طی یک ساعت، اشعهٔ ماوراء بنفش، فرمالین و اتانول ۷۰ تا ۷۰ درصد، ترکیب‌های آمونیوم چهار ظرفیتی، آب و صابون بنزالکانیوم کلراید بک درصد غیرفعال می‌شود(۱).



شکل شماره ۲: نمای عرضی ویروس هاری

راه‌های سرایت بیماری به حیوان و انسان

۱. گازگرفتن

اصلی‌ترین راه سرایت بیماری، گازگرفتن به‌وسیلهٔ حیوان هار است. البته از طریق کشیده‌شدن پنجه آغشته به بزاق حاوی ویروس هاری (به‌ویژه در گربه و گربه‌سانان) نیز بیماری منتقل می‌شود.

۲. پوست

بنابراین، پیوند از جسد آلووده به ویروس هاری ممکن است باعث انتقال بیماری شود و به همین دلیل، هرگاه علت مرگ معلوم نبوده یا علائمی مبنی بر آلوودگی دستگاه عصبی مرکزی در هنگام مرگ وجود داشته باشد، باید از پیوند عضو یا بافت جسد جلوگیری شود.

همچنین، در بررسی سال ۱۹۸۵ در پاکستان، ابتلای تعدادی نوزاد به هاری ناشی از آلوودگی شخص ختنه کننده بود که مرحل ختنه را به بزاق خود نهفتگی بیماری را طی می‌نموده و طبق سنت، محل ختنه را به بزاق خود آغشته کرده است. بنابراین، در نگهداری و پرستاری از شخص مبتلا به هاری باید تمام جوانب احتیاط رعایت شده و ضمن استفاده از وسایل حفاظتی کامل، لوازم و وسایل بیمار را با دقت هر چه بیشتر ضدغونی کرد. به علاوه، پزشکان موظفند در برخورد با هر مورد آنسفالیت و فلاح به بررسی سابقه حیوان گزیدگی بیمار نیز توجه نمایند.

علائم بیماری در حیوان

تمام پستانداران خونگرم اهلی و وحشی به بیماری هاری حساس هستند و میزان‌های مختلف موجب گسترش وسیع هاری می‌گردند. طی بررسی‌های مختلف کارشناسان انسیتو پاستور ایران روی خفاش‌های نقاط مختلف ایران، تاکنون مورد مثبتی مشاهده نشده است.

دوره نهفتگی در سگ و گربه معمولاً^۲ ۳ تا ۳ هفته و گاهی چند ماه است. درخصوص بروز علائم هاری در حیوان باید به این نکته مهم توجه داشت که در برخی موارد، ۳ تا ۱۰ روز قبل از بروز علائم بالینی در سگ و گربه، ویروس موجود در بزاق حیوان می‌تواند بیماری را منتقل کند. به عبارت دیگر اگر بزاق سگ و گربه در زمان گازگرفتن به ویروس هاری آلوده باشد، علائم بالینی حداقل تا ۱۰ روز بعد در حیوان ظاهر شده و خواهد مرد. به همین دلیل، پس از هر گازگرفتن توسط این دو حیوان، باید آنها را تا ۱۰ روز در قرنطینه نگهداشت. پس از طی دوره نهفتگی،

۳. نسوج مخاطی

ویروس هاری از طریق مخاط آلووده نیز به انسان و حیوان‌های دیگر منتقل می‌شود. بنابراین، سگ‌ها و گربه‌های به‌ظهور سالم که در اوخر دوره نهفتگی بیماری هاری هستند و هنوز علائم بالینی هاری در آن‌ها ظاهر نشده است، از طریق لیسیدن لب، چشم و بینی کودکانی که با آن‌ها بازی می‌کنند بیماری هاری را انتقال می‌دهند.

۴. تنفس

سرایت هاری از طریق تنفس، به‌ویژه در غارهای محل زندگی خفاش‌های آلووده. امکان‌پذیر است.

۵. دستگاه گوارش

انتقال از این راه بعید است؛ ولی حیوان گوشتخوار ممکن است به‌ندرت از طریق خوردن لاشه حیوان‌های مرده در اثر ابتلا به هاری به این بیماری مبتلاشوند. به‌حال باید از خوردن گوشت و فرآورده‌های دام‌های مبتلا به هاری خودداری کرد.

۶. جفت^۱

از آنجا که در یک بررسی، ویروس هاری را از جنین، رحم و تخمدان‌های یک حیوان ماده جدا کرده‌اند، انتقال هاری از طریق جفت نیز بعید نیست.

۷. وسایل آلووده

ویروس هاری بسیار حساس است و در مقابل نور و خشکی به سرعت ازین می‌رود؛ بنابراین هاری از طریق وسایل آلووده فقط در موارد استثنایی منتقل می‌شود.

۸. انسان به انسان

تا به حال، موارد معبدودی انتقال هاری از انسان به انسان از طریق پیوند اعضا در دنیا گزارش شده است (دو مورد نیز از ایران در پیوند قرنیه در سال ۱۳۷۳)؛

اين مرحله به طور معمول در انسان ۱۵ روز تا ۳ ماه و به طور متوسط ۱ تا ۲ ماه (۷۵٪ موارد کمتر از ۳ ماه) به طول می‌انجامد. ولی از چند روز تا بیش از ۳ ماه، حتی تا چند سال هم مشاهده شده است. طول دوره نهفتگی

اولین علامت بیماری، تغییر در رفتار و عادت‌های حیوان است؛ به نحوی که یا بیش از اندازه به صاحب خود انس و الفت پیدامی کند و مثل این که از او کمک می‌طلبد یا عصبانی و بدخوشde، غذای خود را به دلیل اختلال در بلع به خوبی نمی‌خورد.

پیشرفت بیماری در برخی موارد به صورت فلنجی (هاری ساكت) بوده، حیوان به گوشه‌ای پناه می‌برد و ابتدا دست‌ها، سپس پاهای و بعد سایر اندام‌ها فلنج شده و در نهایت به علت فلنج دستگاه تنفسی می‌میرد؛ ولی در بیشتر موارد، پس از دوره تغییر رفتار، حیوان پریشان و مضطرب و کم کم وحشی و درنده (هاری خشمگین) می‌شود و به گازگرفتن سنگ و چوب و اشیای مختلف پرداخته و محل زندگی خود را ترک می‌کند و بدون هدف به هر جایی می‌رود و به هر کس و هر حیوان سر راه خود حمله می‌کند. در نهایت، پس از مدتی در اثر دوندگی زیاد و گرسنگی و تشنگی به علت عدم قدرت بلع، کف از دهانش سرازیر شده و پی‌درپی زمین می‌خورد. صدای پارس حیوان خشن، ناموزون و بریده بوده و درنگی در چهره‌اش هویتا است. در اغلب موارد، مردم سگ‌ها را می‌کشند و اگر فرار کنند، به زودی در اثر فلنج دستگاه تنفسی خواهند مرد. گریبه پس از طی دوره نهفتگی به محل تاریکی می‌رود و از طریق پنجه کشیدن، مشابه گازگرفتن سگ یا گرگ، هاری را انتقال می‌دهد. در واقع، از آنجا که از طریق لیسیدن دائم، پنجه‌های خود را به بزاق خود آغشته می‌کند، با پنجه کشیدن بر دست و پا یا صورت انسان یا حیوان دیگر هم می‌تواند با ایجاد خراش، ویروس هاری را منتقل کند.

علامات بالینی در انسان

دوره بیماری هاری به چهار مرحله تقسیم می‌شود:

۱. مرحله نهفتگی

2

علامت بالینی در انسان

2

علامت بالینی در انسان

هیجان، مشخصه این شکل بیماری است. ترس از آب علامتی است که در این شکل در بیشتر موارد دیده‌می‌شود و موجب انقباض‌های دیافراگم و عضله‌های تنفسی می‌شود. همچنین نسیم ملایم، نور شدید، صدای بلند و لمس کردن ممکن است موجب تحریک‌پذیری و انقباض عضله‌های حنجره و حلق و سایر عضله‌های تنفسی شود^(۳). افزایش ترشح بزاق و اختلال در بلع موجب شکل مشخص بیماری هاری می‌شود. خواب آلوودگی، توهمندی، حالت تهاجم، انقباض‌های عضلانی، علائم منژیت، تشنج و فلخ موضعی به سرعت ظاهر می‌شود. اختلال‌های خُلقی دوره‌های ایجاد می‌شود و با پیشرفت بیماری، تا زمانی که بیمار وارد کما شود دوره‌های سلامت کوتاه می‌شود. در معاینه، درجه حرارت بدن ممکن است بیش از 40°C باشد؛ اختلال سیستم عصبی اتونوم شامل گشادشدن نامنظم مردمک، افزایش ترشح اشک، بزاق، تعریق و کاهش فشار خون وضعیتی است.



شکل شماره ۳: حالت هیجانی و بی‌قراری در بیمار مبتلا به هاری

2

علائم بیانی در انسان

به شدت زخم، تعداد جراحت و محل آن‌ها بستگی دارد، به نحوی که گازگرفتن صورت زودتر موجب بروز علائم بیماری می‌شود، سوش ویروس آلووده کننده، همچنین سن و گازگرفتن از روی لباس یا وسایل حفاظتی نیز در طول دوره نهفته‌گی تأثیردارد. البته باید در نظر داشت در برخی موارد، طولانی بودن دوره نهفته‌گی هاری ممکن است سبب فراموشی و گزارش غلط از تاریخ دقیق گازگرفتن شود. همچنین به دلیل تعدد و شدت خشم‌های ایجاد شده در کودکان نسبت به بزرگسالان، و در نتیجه، ورود ویروس‌های بیشتر به بدن آنان، طول دوره نهفته‌گی ممکن است کوتاه‌تر باشد.

۲. مرحله بروز علائم اولیه (غیراختصاصی)
این مرحله به طور معمول ۱-۴ روز (حداکثر ۱۰ روز) به طول می‌انجامد و در پایان دوره نهفته‌گی، ویروس هاری به محل اتصال عصب و عضله یا انتهای اعصاب حرکتی سطحی نفوذ کرده و به طرف نخاع و سیستم اعصاب مرکزی حرکت می‌کند. در زمان آشکارشدن علائم، ویروس هاری را می‌توان با عیار بالا در سیستم اعصاب مرکزی یافت. علائم اولیه غیراختصاصی هاری عبارتند از: تب، لرز، خستگی، سردرد، ضعف و درد عضلانی، بی‌اشبابی، اشکال در بلع، حالت تهوع و استفراغ، سرگیجه، دردهای شکمی و اسهال، گلودرد، تنگی نفس، سرفه خشک، نگرانی و ترس، تحریک‌پذیری و عصبی بودن.

علائم بسیار اختصاصی این مرحله عبارتند از: علائم موضعی در محل گازگرفتن شامل سوزش، گزگز و مورمور (در ۵۰ تا ۸۰ درصد بیماران)، این علائم در مسیر عصب حسی عضو گازگرفته شده نیز به عمل تکثیر ویروس در ریشه خلفی عصب حسی بروز می‌کند.

۳. مرحله حد عصبی
این مرحله احتمالاً بسته به سوش ویروس به دو شکل ظاهر می‌شود:
الف) شکل هیجانی^۱ یا خشمگین: علائم فعالیت حرکتی شدید شامل دویدن و دست و پا زدن، تحریک‌پذیری و عدم آرامش، توهمندی، نگرانی و

1. Furious

+

راهنمای کشوري مبارزه با هاري



2

علامهٔ بالپی در انسان

شكل شماره ۴: افزایش ترشح بزاق و تعریق فراوان ناشی از اختلال سیستم عصبی اتونوم در هاری

+

راهنمای کشوري مبارزه با هاري

همچنین شواهد فلنج اعصاب حرکتی فوقانی^۱ شامل ضعف، افزایش واکنش قاندون‌های عمیق و واکنش کف‌پایی(بابنیسکی) مثبت همیشه وجود داشته،

2

علامهٔ بالپی در انسان

1. Upper motor neurone

+

+

طول مدت مراحل مختلف هاري

یافته‌ها	مدت و درصد موارد	شكل و درصد	مرحله
وجودندار	کمتر از ۳۰ روز(٪۲۵) ۳۰ تا ۹۰ روز(٪۵۰) روز تا یک سال(٪۲۰) بیشتر از یک سال(٪۵)		نیفته‌گی
سوژش و گزگز یا درد، در محل ذخم، تب، ضعف، بی‌اشتباهی، حالت تهوع و استفراغ	بروز علائم ۱۰ روز		اویله
توهم، هیجان، تهاب، گازگرفتن، ترس از آب، اختلال‌های اعصاب خودکار، سندروم ترشح ناکافی هورمون آنتی‌دیورتیک	۷ روز تا ۲	هاري هیجانی(٪۸۰)	داد عصبی
فلج شل پایین رونده	۷ روز تا ۲	هاري فلجي(٪۲۰)	
صفر تا ۱۴ روز		کما و مرگ	

2

علائم پیش از ابتلاء

تشخیص‌های افتراقی

سایر آنسفالیت‌های ویروسی، کزار، آنسفالیت سمی، آنسفالیت آرژیک، سندروم گیلن‌باره، پولیومیلیت و سایر نوروپاتی‌ها و میلوپاتی‌ها، پلی‌نوروپاتی التهابی، میلیت عرضی و واکنش‌های روانی به دنبال گازگرفتن حیوان^۱ (ترس کاذب از آب)، در تشخیص افتراقی بیماری هاری مطرح هستند: ظهور اختلال فعالیت پایه‌های مغزی در مراحل اویله، وجه افتراقی هاری از سایر آنسفالیت‌های ویروسی بوده که نشان‌دهنده و خامت بیماری است و علائم آن عبارتند از: دویینی، فلچ عضله‌های صورت و نوریت عصب

1. Rabies hysteria

فلج تارهای صوتی نیز شایع است؛ دویینی، فلچ عضلات صورت و نوریت عصب اپتیک نیز مشاهده‌می‌شود. افزایش تعداد تنفس و حتی آپنه دیده‌می‌شود؛ اختلال ریتم قلب شایع بوده و به خصوص تاکی کاردی فوق بطنی و برادی کاردی به دلیل اختلال فعالیت پایه‌های مغز^۲ یا میوکاردیت اتفاق می‌افتد (۴). در اکثر موارد، بیماران طی یک تا دو هفته دچار کما شده و با وجود مراقبت‌های شدید به دلیل نارسایی تنفسی یا کلپس قلبی عروقی فوت می‌کنند.

ب) شکل فلجي² یا ساکت: دوره بیماری در این شکل به طور معمول، طولانی‌تر از هاری خشمگین است (۴). شکل فلجي کمتر شایع است (۲۰ درصد موارد). مهم‌تر این که در اغلب موارد تشخیص داده‌نمی‌شود و بر عکس فرم هیجانی ترس از آب و نسیم و افزایش فعالیت یا تشننج به طور معمول وجود ندارد (۵).

علائم این شکل عبارتنداز: ضعف در اندام گازگرفته‌شده و به تدریج در سایر اعضاء و عضله‌های صورت در اوایل این مرحله؛ کاهش هوشیاری و اختلال در حس؛ فلچ پایین رونده مشابه پلی‌نوروپاتی التهابی حاد (سندروم گیلن‌باره) یا فلچ چهار عضو به طور قرینه؛ نشانه‌های منتهی (سردرد و سفتی گردن) ممکن است اتفاق‌افتد و در نهایت، بیمار دچار خواب آلودگی و کما می‌شود. گاهی بیماری به شکل هیجانی تغییر می‌یابد.

2

علائم پیش از ابتلاء

مرحله کما و مرگ

در نهایت، ابتلا به بیماری هاری به مرحله کما می‌رسد و بیمار به علت نارسایی و آپنه یا کلپس قلبی عروقی می‌میرد. از شروع علائم بالینی تا مرگ به طور متوسط ۴ تا ۷ روز طول می‌کشد. در موارد نادر با مراقبت‌های شدید از بیماران، طول عمر بیشتر می‌شود؛ ولی عوارض دیررس شامل ترشح ناکافی هورمون آنتی‌دیورتیک، دیابت بی‌مزه، اختلال در ریتم قلبی، عدم استحکام عروقی، سندروم نارسایی تنفسی بالغین (ARDS)، خونریزی گوارشی، کاهش پلاکت‌ها و ایلئوس پارالیتیک ایجاد می‌شود.

1. Brain-stem
2. Paralytic

+

- شکل شماره ۵: تست مثبت فلوئورسنت آنتی بادی در نمونه مغز
- تشخیص آنتی زن ویروس به روش FAT از لام پوست ناحیه گردن یا قرنیه، قبل از مرگ؛

اپتیک به دلیل گرفتاری اعصاب مغزی، ترس از آب و ایجاد انقباض به دنبال بلع، افزایش ترشح بزاق، اشک، عرق و اختلال در بلع.

تشخیص

در صورت ظهور علائم حاد عصبی به شکل هیجانی یا فلنجی و بهویژه اگر سابقه گازگرفتن با خراش توسط حیوان وجود داشته باشد و بیمار به سرعت وارد کما شود و در مدت ۷ تا ۱۰ روز فوت کند، همیشه بیماری هاری مطرح است. اگرچه به ندرت ممکن است هیچ گونه سابقه تماس با حیوان کشف نگردد.

تشخیص آزمایشگاهی

نتایج آزمایش‌های همو گلوبین و آزمایش‌های شیمیایی معمول خون طبیعی است. آزمایش‌های غیرطبیعی در ارتباط با اختلال فعالیت هیپوتالاموس شامل خونریزی گوارشی و سایر عوارض است. گلبول‌های سفید خون محیطی افزایش مختصری خواهد داشت (۱۲۰۰۰-۷۰۰۰)؛ ولی ممکن است طبیعی یا بالاتر از ۳۰۰۰ نیز باشد. همچنین بررسی مایع نخاعی در تعداد محدودی از بیماران غیرطبیعی بوده و شامل افزایش لنفوسيت‌ها (۵ تا ۳۰ سلول در میلی‌متر مکعب) گلوکز طبیعی و افزایش مختصر پروتئین (کمتر از ۱۰۰ mg/dl) مشاهده می‌شود (۵).

نحوه
پیش

معیارهای تشخیص آزمایشگاهی اختصاصی

- تشخیص آنتی زن ویروس به روش FAT (تست فلوئورسنت آنتی بادی) در بافت مغز تهیه شده پس از مرگ؛



3

علائم
بلطفه در انسان

2

علائم
بلطفه در انسان

+

+

+

راهنمای کشوري مبارزه با هاري

— **مورد مشکوک^۱**: مورد سازگار با توصیف کلینیکی شامل ظهور ناگهانی علائم عصبی به شکل هیجانی از قبیل تحریک‌پذیری، تشنج، ترس از آب، ترس از نور، افزایش ترشح بزاق، اختلال در بلع و تنفس و با شکل فلنجی(بی‌سرورصد) که بیمار به سرعت وارد کما شده و در مدت ۱-۷ روز فوت کند.

— **مورد محتمل^۲**: وجود علائم مرحله مشکوک به اضافه ساقمه تماس با حیوان مشکوک به هاري.

— **مورد قطعی^۳**: وجود علائم مرحله مشکوک به اضافه تشخیص آزمایشگاهی اختصاصی.

۲. انسان در تماس با هاري

— تماس محتمل: شخصی که از طریق بزاق، گزش یا خراش یک حیوان حساس به هاري یا حیوانی از منطقه آلوده به هاري مورد مواجهه قرار گرفته است.

— تماس قطعی: شخصی که از طریق بزاق، گزش یا خراش یک حیوان با تشخیص قطعی هاري یا حیوان متواتری شده مورد مواجهه قرار گرفته است.

درمان

درصورت شروع علائم هاري، بیماری درمان‌پذیر نیست و با وجود مراقبت‌های كامل، بیماران در طی بک تا دو هفته پس از شروع علائم می‌میرند. تاکنون فقط ۳ مورد بیبودی از بیماری هاري گزارش شده است. بسیاری از داروها شامل انترفررون، عوامل تولید کننده انترفررون، ریباویرین

3
۲
۱

- 1. Suspected
- 2. Probable
- 3. Confirm

راهنمای کشوري مبارزه با هاري

— تست فلوئورسنت آنتی‌بادی مثبت FAT بعد از تزریق بافت مغز، بزاق یا مایع نخاعی در کشت سلول یا موش؛ بررسی میکروسکوپیک نمونه‌های مغز از نظر وجود اجسام‌نگری بهخصوص در سلول‌های هرمی هیپوکامپ؛



شکل شماره ۶: وجود جسم‌نگری در داخل سلول آلدوده با رنگ‌آمیزی H&E

— یافتن تیتر آنتی‌بادی نوتزالیزان هاري در سرم و مایع نخاعی افراد غیرواکسینه؛

— مشخص کردن آنتی‌ژن ویروس با روش PCR^۱ روی نمونه بافت مغز تهیه شده پس از مرگ یا در نمونه کلینیکی(پوست، قرنیه یا بزاق).

تعاریف و طبقه‌بندی موارد

براساس آخرین مصوبه کمیته کشوری هاري و مطابق با توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، طبقه‌بندی موارد انسان مبتلا به هاري و انسان در تماس با هاري در انواع مشکوک، محتمل و قطعی به شرح ذیل است:

۱. انسان مبتلا به هاري

1. Polymerase Chain Reaction

د) ضد عفونی یا معده کردن وسایل آلوده به ترشحات بیمار ه-) دفن بهداشتی ویژه جسد افراد مبتلا به هاری در این موارد باید جسد را پس از ضد عفونی در یک کیسه نایلونی ضخیم و نفوذناپذیر قرارداده و به طور عمیق دفن نمود.

3

۲۵

و سیتوزین آرایینوزاید در درمان بیماران مبتلا به هاری به کار رفته‌اند، ولی هیچ یک مؤثر واقع نشده‌اند(۵).

بیمار مبتلا به هاری باید در اتاق ایزوله تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرد؛ به این ترتیب که پس از بستری کردن بیمار در یک اتاق کم‌نور در محلی بی‌سرrocada و ساکت و آرام، اقدام‌های ذیل را انجام داد:

- تزریق داروهای آرامبخش و ضدتشنج؛
- جایگزینی مایع و الکترولیت؛
- تزریق آنتی‌بیوتیک در صورت وجود عفونت؛
- باز نگهداشتن راه‌های تنفسی؛
- درمان نارسایی تنفسی و قلبی‌عروقی.

اقدام‌های لازم در برخورد با بیمار مشکوک به هاری و موارد تماس الف) استفاده از وسایل حفاظتی شامل: دستکش، ماسک، گان، عینک و... جبیت کارکنان بیمارستان (پزشک، پرستار، خدمتگزاران و...) ملاقات کنند گان و سایر کسانی که به نحوی با بیمار در تماس هستند.

3

۲۹

ب) واکسیناسیون کامل هاری (۵ نوبتی) در موارد زیر:

- کارکنانی که در مراقبت و درمان بیمار فعالیت دارند؛
- افراد در تماس مستقیم با بیمار، مانند افراد خانواده؛
- افراد در تماس غیرمستقیم با بیمار از طریق وسایل آلوده به ترشحات.

ج) سرم ضد هاری و واکسیناسیون کامل هاری (۵ نوبتی) در موارد زیر:

- افراد در تماس که دارای زخم باز یا ترک در پوست هستند.
- افرادی که در طی تماس با بیمار یا جسد دچار صدمه به پوست شده‌اند؛
- هرگونه تماس با ترشحات آنها (پوستی یا مخاطی و...).

نهادهای مرتبط نقش مهمی در مبارزه با این بیماری خواهد داشت. لازم به توضیح است که با تصویب و تشکیل شورای عالی سلامت در آینده این هماهنگی‌ها از طریق شورای سلامت پیگیری خواهد شد.

- الف) فعالیت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
- ب) وظایف سایر نهادها و سازمان‌ها.

الف) فعالیت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱. تقویت و گسترش هماهنگی بین‌بخشی با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در سطح کشور.
۲. تهیئة دستورالعمل و برنامه کشوری از طرف مرکز مدیریت بیماری‌ها.
۳. بازنگری در فرم‌های مراقبت و گزارش‌دهی، تعاریف و دستورالعمل مربوط به هاری و بهبود نظام گزارش‌دهی و بازآموختگی کارکنان دانشگاه‌ها در این زمینه توسط مرکز مدیریت بیماری‌ها.
۴. آموزش کادر فنی بهداشت و درمان و مردم توسط مرکز مدیریت بیماری‌ها با همکاری انتستیتو پاستور ایران مشتمل بر:

- کارشناسان مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها و پزشک اپیدمیولوژیست مراکز بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی؛
- آموزش کارکنان فنی آزمایشگاهی شاغل در آزمایشگاه‌های تشخیص هاری؛
- آموزش مردم در زمینه اهمیت بیماری، راههای سرافیت و راههای پیشگیری از ابتلا به بیماری و نقش مهم درمان پیشگیری فوری آسیب‌دیدگان در جلوگیری از ابتلا به هاری و به روش‌های مختلف، از جمله صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط جمعی.

۵. راهاندازی مراکز جدید تشخیص هاری در استان‌ها توسط انتستیتو پاستور ایران.
۶. تهیه و توزیع مطالب کمک‌آموزشی و مواد و تجهیزات مختلف، مشتمل بر:

3

کنترل و پیشگیری هاری در ایران

کنترل و پیشگیری هاری در ایران

با توجه به اهمیت بیماری هاری، مشکلات و تنگاه‌هایی که در راه کنترل بیماری هاری در سطح کشور وجود دارد، برنامه کشوری کنترل و پیشگیری این بیماری با همکاری بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری انتستیتو پاستور ایران و با نظر کارشناسی اعضای کمیته فنی هاری به شرح زیر مورد بازنگری قرار گرفت. امید است با حمایت و پشتیبانی شورای هماهنگی مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان در سطح کشور با اجرای برنامه در معاونت‌های بهداشتی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و ایجاد هماهنگی و جلب همکاری مسئولان سایر بخش‌ها و جلب مشارکت مردم و تلاش کارکنان بخش بهداشت و درمان در سطوح مختلف شبکه در امر مبارزه با هاری به عنوان یکی از معضلات بهداشتی کشور قدم‌های مؤثری برداشته شود. این برنامه‌ها در سطوح مختلف شبکه به شرح زیر است:

۱. سطح کشور؛
۲. سطح استان و دانشگاه؛
۳. سطح شهرستان؛
۴. سطح محیطی (مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری و خانه‌های بهداشت).

۱. سطح کشور

در سطح کشوری اقدام‌ها و فعالیت‌های زیر بایستی توسط وزارت‌تخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و دیگر نهادهای مرتبط انجام شود. در این خصوص، شورای هماهنگی کنترل بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان که با ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضویت تعدادی از وزرا یا نمایندگان تام‌اختیار آن‌ها تشکیل شده با پشتیبانی و ایجاد هماهنگی بین

کنترل و پیشگیری هاری در ایران

کشورهای موفق در این زمینه در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته و بهاجرا درآید.

۴. تهیه طرح شناسایی سگ‌های خانگی و گله، واکسیناسیون آن‌ها علیه هاری و قلاده‌گذاری آن‌ها توسط سازمان دامپزشکی کشور.

۵. برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های آموزشی توسط سازمان دامپزشکی کشور به منظور آموزش نیروهای فنی و کارشناسان شاغل در دامپزشکی استان‌ها و مردم، بهخصوص دامداران و رستیلیان و تهیه مطلب آموزشی.

۶. تهیه و توزیع واکسن ضد هاری حیوانی، قلاده و امکانات مورد نیاز جهت اجرای طرح شناسایی و واکسیناسیون سگ‌های صاحب‌دار و همچنین کیت نمونه‌برداری جهت نمونه‌برداری از حیوان‌های مشکوک.

۷. پشتیبانی و حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمینه تصویب اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و سازمان دامپزشکی کشور و وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست.

۲. سطح استان و دانشگاه

ریاست دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و معافون بهداشتی وی به عنوان دبیر شورا مسئولیت اجرایی برنامه را در سطح دانشگاه‌ها به عهده دارند و بایستی با ایجاد هماهنگی، از طریق نهادهای مرتبط اقدام‌های ذیل را انجام دهند.

- الف) اقدام‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی؛
- ب) اقدام‌های سایر سازمان‌ها.

الف) اقدام‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی
تقویت و گسترش هماهنگی بین‌بخشی با سازمان‌های مرتبط در استان و یا دانشگاه و جلب حمایت و پشتیبانی مسئولان سیاسی

3

کنترل و پیشگیری هدایتی درآمد

۱

— پوسترهاي آموزشي و پمكلت در زمينه هاري توسط مرکز مدیریت بیماری‌ها؛

— واکسن و سرم ضد هاري انساني توسط معاونت سلامت، و معاونت غذا و دارو؛

— وسائل آزمایشگاهی مورد نیاز به منظور راهاندازی آزمایشگاه‌های تشخیص هاری.

۷. نظارت بر اجرای برنامه‌های مبارزه با هاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح کشور.

۸. مراقبت از بیماری و بررسی گزارش‌های ماهیانه معاونت‌های بهداشتی سراسر کشور و ارائه پس‌خوراند^۱ مناسب به آن‌ها.

۹. تشکیل کمیته فنی هاری و استفاده از نظرات اعضا به منظور تهیه، تدوین و بازنگری دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های کشوری.

(ب) وظایف سایر نهادها و سازمان‌ها

۱. تشکیل ستاد نابودی حیوان‌های زیبانبار(سگ و گربه) و تهیه طرح و برنامه مربوطه و ابلاغ به استانداری‌ها توسط وزارت کشور.

۲. پیگیری و تأکید وزارت کشور جهت جمع‌آوری و دفن صحیح زباله توسط استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها به منظور کاهش جمعیت حیوان‌های زیبانبار و مبارزه با آن‌ها.

۳. برنامه‌ریزی و اقدام جهت مبارزه با هاری در وحوش توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با توجه به وجود مخازن بیماری در وحش و به منظور پیشگیری از میزان آسودگی در آن‌ها اقدام‌های لازم از جمله واکسیناسیون و حوش علیه هاری که در بعضی از کشورهای اروپایی اجرامی شود نیز بایستی با همکاری سازمان دامپزشکی و دیگر نهادها و با استفاده از آخرین اطلاعات و تجربیات

۳. بررسی و تحقیق جهت تخمین جمعیت سگ‌های ولگرد.
۴. تهیّه طرح شناسایی و واکسیناسیون سگ‌های خانگی و گله توسط اداره کل دامپزشکی استان و پیگیری تأمین واکسن، کارت و قلاده مورد نیاز.
۵. تهیّه امکانات نمونهبرداری(کیت نمونهبرداری) از حیوان‌های مهاجم توسط دامپزشکی استان.
۶. آموزش کارکنان فنی شاغل در شبکه‌های دامپزشکی و مردم، بهخصوص گروه‌های در معرض خطر از جمله کشاورزان، دامداران و ...
۷. مبارزه با هاری و هوش توسط اداره کل حفاظت محیط‌زیست.
۸. کمک و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت تصویب اعتبارات مورد نیاز سازمان‌ها جهت امر مبارزه.
۹. کمک سازمان صدا و سیما مراکز استان‌ها جهت تولید و پخش برنامه‌های آموزشی.

۳. سطح شهرستان

- الف) اقدام‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان:
- ب) اقدام‌های سایر اداره‌های شهرستان‌ها.

- الف) اقدام‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان در اجرای برنامه مبارزه با هاری بایستی اقدام‌های ذیل را انجام دهد:
۱. هماهنگی بین‌بخشی بهمنظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در گیر امر مبارزه با هاری در جلسه‌های شورای اداری و شورای بهداشت شهرستان که با حضور فرماندار تشکیل می‌شود بایستی مخاطره‌ها، اهمیت بیماری، زیان‌ها و خسارت‌های اقتصادی هاری و حیوان‌گزیدگی توسط رؤسای شبکه‌ها و مراکز بهداشت مطرح و نسبت به حساس‌کردن مسئولان در جهت

کنترل و پیشگیری هایی در بخش

کنترل و پیشگیری هایی در بخش

- استان و شهرستان از طریق تشکیل جلسه‌های شورای سلامت یا شورای هماهنگی کنترل بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان.
- ناظارت، مراقبت و ارزشیابی اجرای برنامه در شهرستان‌های تابعه.
- بهبود نظام مراقبت و گزارش‌دهی از طریق بازآموزی کارکنان مراکز بهداشت شهرستان‌ها و جمع‌آوری گزارش‌های ماهانه شهرستان‌ها، بررسی و تهیّه پس‌خواراند به شهرستان و ارسال اطلاعات مربوطه به مرکز مدیریت بیماری‌ها، به‌نحوی که گزارش‌های هر ماه تا پیستم ماه بعد به تهران رسیده باشد.
- تأمین امکانات نمونهبرداری(کیت نمونهبرداری) از حیوان‌های مهاجم توسط مرکز بهداشت استان.
- پیگیری تأمین و توزیع واکسن و سرم ضد هاری و کزار و سایر داروهای جنبی و تجهیزات مورد نیاز.
- آموزش:

- کارکنان فنی شاغل در بخش درمان پیشگیری شهرستان‌ها توسط مرکز بهداشت استان؛
- کارکنان بخش بهداشت و درمان در سطوح مختلف(به‌ورزان، تکنسین‌ها، کاردان‌ها و کارشناسان مبارزه با بیماری‌ها و پزشکان)؛
- دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی؛
- مقامات سیاسی و مسئولان استان‌ها، روحانیون و ائمه جمعه؛
- مردم به روش‌های مختلف، از جمله صدا و سیما و سایر وسائل ارتباط جمعی.

- (ب) اقدام‌های سایر سازمان‌ها
۱. تشکیل جلسه شورای بهداشت یا شورای سلامت توسط استانداری و مطرح نمودن بیماری.
 ۲. تشکیل جلسه ستاد نابودی حیوان‌های زیانبار(سگ و گربه‌های ولگرد) توسط استانداری.

- خودداری از ریختن زباله و پسماندهای غذایی در اطراف منازل و گذرگاهها و معابر عمومی و استفاده از کیسه‌های مخصوص حمل زباله و همکاری با مأموران شهرداری در هنگام جمع‌آوری زباله؛
- همکاری با مأموران شهرداری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست در نابودی سگ‌های ولگرد؛
- جلوگیری از تماس سگ‌های خانگی با سگ‌های ولگرد؛
- در صورت بروز هرگونه تغییر رفتار در حیوان‌ها، مراتب باید فوری به دامپزشکی اطلاع داده شود.

نکته

چون اکثر موارد حیوان‌گزیدگی در گروه سنی نوجوان و بین دانش‌آموzan اتفاق می‌افتد، توجه خاص به این گروه جهت افزایش سطح آگاهی آنان درخصوص هاری و نزدیک شدن به محل تجمع سگ‌های ولگرد و عدم تحریک آن‌ها و به کاربردن نکات حفاظتی در موقع برخورد با سگ و ولگرد نقش مهمی در کاهش موارد حیوان‌گزیدگی دارد.

4

کنترل و پیشگیری هایی در اینجا

- ◀ کارکنان در سطوح مختلف شبکه‌های بهداشت و درمان و دامپزشکی شهرستان مشتمل بر بیورزان، تکنسین‌ها و کارداران‌ها و کارشناسان مبارزه با بیماری‌ها، پزشکان مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها و به خصوص، بخش‌های اورژانس، دامپزشکان و تکنسین‌های دامپزشکی و ... در زمینه برنامه‌های اجرایی و پروتکل‌های درمان پیشگیری.
- ◀ دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در زمینه اپیدمیولوژی و اهمیت بیماری با تأکید بر برنامه‌های اجرایی و پروتکل درمان پیشگیری در کشور.
- 4. مراقبت بیماری هاری و حیوان‌گزیدگی: این فعالیت یکی از برنامه‌های مهم، پیشگیری از ابتلا به هاری و کنترل بیماری است که در تمام سطوح، از جمله مرکز بهداشت شهرستان به عنوان یک ابزار کلیدی، مدیریت

اجرای برنامه‌های مربوط اقدام شود و از طرف دیگر حمایت‌ها و پشتیبانی مسئولان و مقامات را به منظور موفقیت در اجرای برنامه‌ها جلب نمود.

۲. پیگیری در تشکیل کمیته ائلاف سگ‌های ولگرد زیر نظر فرمانداری
۳. آموزش:

◀ آموزش مردم، با توجه به این که بیشتر موارد مرگ‌ومیر هاری انسانی در اثر ناگاهی و عدم اطلاع مردم از اهمیت این بیماری و راه‌های صحیح پیشگیری از بیماری است، اگر بتوان به مردمی که در مخاطره ابتلا به این بیماری قراردارند و اغلب از طبقه‌های کم‌سواد و یا بی‌سواد جامعه (چوپانان، روستاییان، دامداران، شکاربازان جنگل‌بازی، رفتگران و ...) هستند، این آگاهی را داد و آن‌ها را از وحامت بیماری مطلع نمود، بسیاری از مشکلات موجود در راه مبارزه با این بیماری از میان برداشته خواهد شد. بنابراین، لازم است برنامه آموزشی مدونی جهت افزایش آگاهی مردم توسط کارشناسان مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها و آموزش بهداشت شهرستان تنظیم و از راه‌های مختلف صدا و سیما، کارکنان مختلف شبکه، رابطان بهداشت، آموزگاران مدارس و نهضت سواد‌آموزی، روحانیون و ... به اجرا درآید. این برنامه‌ها می‌توانند متنکی بر توصیه‌های ذیل باشد:

- خودداری از تگهداری سگ و گربه در منزل، مگر در موارد استثنایی و در صورت تگهداری، قلاده‌زدن و واکسیناسیون آن‌ها علیه هاری؛
- خودداری از تردد سگ‌های خانگی و صاحب‌دار در معابر عمومی و پارک‌ها؛
- جلوگیری از نزدیک شدن کودکان به سگ‌های ولگرد؛
- توجه خاص به گاز‌گرفتگی حیوان‌ها هر چند جزئی و به صورت خراش باشد، و مراجعة فوری فرد مجرروح به مرکز بهداشت شهرستان؛

آنها خواسته شود که افراد مورد نظر را در هر ساعت از شبانه روز، فوری به این مرکز معرفی نمایند.

اتاق درمان پیشگیری هاری بایستی ویژگی های ذیل را داشته باشد:

۱. محل اتاق طوری انتخاب شود که باعث آسودگی سایر قسمت های مرکز بهداشت نشود و بهتر است وروودی و در جدایگانه ای داشته باشد.
۲. دیواره ای اتاق باید کاشی کاری و کف آن سنگ یا موzaïek قابل شستشو و دارای کف شور باشد.
۳. وجود دستشویی با آب سرد و گرم و همچنین وان و شیر آب جیت شستشوی زخم آسیب دیدگان ضروری است، اگر نصب وان مقدور نباشد، می توان از وان های پلاستیک استفاده نمود.
۴. تأمین تجهیزات مورد نیاز، از جمله: تخت تزریقات، پاراوان، جالباصی، میز چرخدار (تریلر) با وسایل کامل پانسمان، یخچال، ترازوی تو زین، پمپ اکسیژن، انواع سرنگ یکبار مصرف، روپوش، پیش بند پلاستیکی، چکمه و دستکش لاستیکی، عینک، ماسک و سایر وسایل حفاظتی و همچنین کیت مخصوص نمونه برداری از حیوان مهاجم جیت تشخیص هاری.
۵. تأمین مواد بیولوژیک و داروها، از جمله واکسن ضد هاری انسانی، واکسن کراز (توأم یا ثالث) سرم ضد هاری انسانی، سرم ضد کراز (تابولین)، الکل ۴۰ تا ۷۰ درجه، محلول بتادین یک درصد، آمپول های آنتی هیستامین، کورتیکوستروئید و اپس نفرین، آنتی بیوتیک های مورد نیاز، صابون معمولی و مایع.
۶. دفتر مخصوص ثبت نام بیماران جیت درج خصوصیات آسیب دیدگان و شرح واقعه.
۷. کارت واکسیناسیون و مهر مخصوص.
۸. همچنین مسئولان درمان پیشگیری هاری حتماً باید دوره آموزشی و کار آموزی هاری را در انتستیتو پاستور ایران گذرانده و علیه هاری واکسینه شده باشند و حتی المقدور از تعویض های مکرر و جابه جایی

کنترل و پیشگیری هایی در بیمارستان

۴

شهرستان را در اجرای این برنامه ها یاری می دهد. در این قسمت موارد زیر قابل توجه است:

﴿ ثبت بیماران و گزارش دهی مطابق تعاریف و طبقه بندی موارد مندرج در صفحه های ۲۳ و ۲۴.﴾

در برنامه کنترل بیماری هاری تمام موارد محتمل و قطعی هاری در انسان بایستی ثبت و گزارش شود. سپس اطلاعات اپیدمیولوژیکی هر مورد در فرم بررسی اپیدمیولوژیکی جداگانه تهیه و از طریق معاونت بهداشتی دانشگاه مربوط به مرکز مدیریت بیماری ها ارسال شود.

همچنین اطلاعات مربوط به مواجهه ها (موارد حیوان گزیدگی) بایستی همه ماهه براساس فرم های گزارش ماهانه اطلاعات مربوط به موارد حیوان گزیدگی از دفاتر مربوطه در بخش درمان پیشگیری هاری شهرستان تهیه و حداقل تا پنجم ماه بعد به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مربوط ارسال شود (در دانشکده ها یا دانشگاه هایی که فقط یک شهرستان را تحت پوشش دارند، گزارش های مذبور مستقیماً به مرکز مدیریت بیماری ها ارسال می گردد).

﴿ درمان پیشگیری:﴾

برای آسیب دیدگان در معرض گازگرفتگی حیوان ها، این نوع درمان پیشگیری لازم است در دسترس فوری باشد.

همان طور که ذکر شد ابتلا به هاری متأسفانه درمان ندارد و به مرگ منجر می شود؛ ولی با انجام اقدام های درمان پیشگیری به موقع می توان از ابتلا به هاری جلوگیری کرد. این کار با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع در هر شهرستان در مرکز درمان پیشگیری و معمولاً در داخل مرکز بهداشت شهرستان یا یکی از مراکز بهداشتی درمانی یا بیمارستان های قابل دسترس مردم انجام می شود. این مرکز بایستی امکان ارائه خدمات شباه روزی را داشته باشد تا افراد حیوان گزیده در هر لحظه بتوانند از اقدام های لازم برخوردار شوند. در ضمن، نام و نشانی این مراکز بایستی به تمام بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک ها و مطب ها اعلام و از

۴. ضد عفونی زخم با محلول بتادین یا الکل اتیلیک ۴ تا ۷۰ درصد و یا سایر مواد ویروس کش(۱).
۵. خودداری از بخیه زدن زخم حیوان گزیده؛ زیرا ویروس هاری بسیار حساس بوده و در مقابل نور و اکسیژن هوا، قدرت بیماری زایی خود را ازدست می دهد. البته در مورد زخم های که شربان های خونریزی دهنده دارند و یا جراحت هایی که موجب پارگی صفاق یا جنب یا عربان شدن استخوان می شوند، می توان اقدام های ترمیمی شامل بخیه زدن شریان و سایر اقدام های لازم را توسط پزشک متخصص جراح انجام داد که در این صورت بایستی مقداری سرم هاری را در داخل و اطراف زخم انفیльтره نمود.
۶. تزریق سرم ضد هاری؛ مطابق پروتکل درمان پیشگیری سازمان جهانی بهداشت در جدول راهنمای درمان پیشگیری ضد هاری پس از مواجهه، سرم ضد هاری فقط به کسانی تزریق می شود که دارای یک یا چند گزیدگی یا خراش های عمیق جلدی (خراشی که در آن خون دیده شود) یا آلووده شدن غشای مخاطی با بزاق و یا خراش های سر و صورت و گردن باشند.
- برای خراش ها و زخم های کوچک و دور از مراکز اعصاب یا لیسیدن شخص به وسیله حیوان های مشکوک به هاری، فقط از تزریق واکسن استفاده می کنند. به هر ترتیب، درباره تجویز واکسن، و یا واکسن همراه با سرم، مسئول مرکز درمان پیشگیری تصمیم می گیرد.
- سرم ضد هاری مورد استفاده در ایران، این منو گلوبولین اختصاصی ضد هاری تهیه شده از پلاسمای انسانی و بدون عارضه است و به تست هم نیاز ندارد. مقدار واحد این سرم روی ویال آن نوشته شده و معمولاً ۱۵۰ واحدی است (۱۵۰ واحد در هر میلی لیتر). مقدار تزریق ۲۰ واحد به ازای هر کیلو گرم وزن بدن محاسبه می شود و در صورت امکان، قسمت اعظم سرم به صورت انفیلتراسیون در اطراف زخم و مابقی به صورت عضلانی در ناحیه سرین تزریق می گردد.

۴ کنترل و پیشگیری هایی در اینجا

آنان توسط مسئولان خودداری شود. در ضمن، دستور العمل درمان پیشگیری و نحوه اقدام در قسمت مربوط شرح داده شده است.

اقدام های درمان پیشگیری درخصوص افراد حیوان گزیده همان طور که گفته شد، در صورت بروز علائم هاری، این بیماری درمان پذیر نبوده و سرانجام به مرگ منجر می شود. البته افرادی که توسط پستانداران اهلی و وحشی گاز گرفته می شوند، اگر بلا فاصله و در اسرع وقت به مراکز درمان پیشگیری مراجعه و تحت اقدام های مربوط قرار گیرند، می توانند از ابتلا به بیماری هاری بپنهانند. لازم به توضیح است که با توجه به وضعیت اپیدمیولوژیک ایران، در تمام موارد حیوان گزیدگی، بایستی حیوان را مشکوک به هاری تلقی نموده و اقدام های لازم را بلا فاصله انجام داد تا خلاف آن ثابت شود و موضوع از نظر هاری منتفی گردد. همچنین، برای شخص حیوان گزیده با هر قدر تأخیر در مراجعه بایستی اقدام های لازم فوری انجام شود. این اقدام ها عبارتند از:

۱. **زدودن و خارج کردن ویروس هاری از محل زخم؛** این عمل که به طریق فیزیکی و شیمیابی انجام می شود، مهم ترین اقدام برای درمان پیشگیری از ابتلا به هاری است. می توان ادعای کرد که درصد بالایی از هرچه زودتر و در ساعات اولیه پس از گازگرفتن، با آب تمیز و صابون، لابه لای زخم را حداقل به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه به طور عمیق شستشو و در جریان آب روان قرارداد، کمک بسیار مؤثری در دفع و خارج کردن ویروس از زخم خواهد داشد(۳).
۲. **خارج کردن کف صابون از لابه لای زخم؛** با استفاده از شیلنگ آب یا پیستول آب پاش باید کف باقیمانده صابون در لابه لای زخم کاملاً شسته شود؛ زیرا باقیماندن صابون اثر بعضی مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده پس از شستشو را خنثی می نماید.
۳. **قطع کامل قسمت های له شده و نکروزه.**

سرم ضد هاري بايستى در داخل يخچال با برودت $^{\circ}C -8$ نگهداری شود و نباید زير صفر درجه باشد. در ضمن، ويالهای را که محتوای آنها تغييرنگ داده است نباید مصرف کرد. اگر حجم سرم مورد نياز مجروح بيش از 5 ميلی ليتر باشد، باید در دو محل جدآگاهه تزريريق شود؛ زيرا تزريريق مقدار زياد سرم در يك محل موجب آزرجي عضله و احتمالاً آبسه خواهد شد.

در صورتى که سرم ضد هاري انساني (هومولوگ) در دسترس نبوده و استفاده از نوع حيواني (هترولوگ) الزامي باشد، اولاً بايستى قبل از تزريريق، تست حساسيت انجام داد؛ ثانياً به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن مجروح، ٤ واحد محاسبه و تجويز شود. عوارض ناخواسته سرمهاي ضد هاري انساني از قبيل شوك آنافيليک، تورم عصبی عروقی و عوارض کلیه بسيار نادر است؛ فقط گاهی موجب درد و تب مختصر خواهد شد.

٧. تزريريق واكسن ضد هاري؛ واكسن ضد هاري کشت سلولی در پنج نوبت، روزهای صفر، ٣، ٧، ١٤ و ٣٠ به صورت عضلانی و حتماً در عضله دلتoid باز و تزريريق می شود. در اطفال کمتر از دو سال باید در ناحیه فوقانی و جانبی ران تزريريق شود و هر گز نبایستی سرین را به عنوان محل تزريريق انتخاب کرد. معمولاً ٧-١ روز پس از اولین تزريريق واكسن، آنتی بادی در بدن شخص ظاهر می شود و اگر شخص قبلًا واكسینه شده باشد و تزريريق واكسن به عنوان يادآور تزريريق گردد، ظهور آنتی بادی زودتر خواهد بود.

از قدیم، جیت درمان پیشگیری آسیب دیدگان حیوان گزیده، واكسن های مختلفی کشف و مورد استفاده قرار گرفته که عبارتند از: واكسن نخاع خرگوشی، واكسن فرمی¹، واكسن فلوری¹، واكسن تهیه شده در جنین اردک (D.E.V)، واكسن های کشت سلولی (H.D.C)، P.C.E.C و Vero.

عوارض واكسن های ضد هاري کشت سلولی بسيار ناچيز و نادر و در معدودی از افراد به صورت سرخی و تورم غدد لنفاوی مجاور و گاهی سردرد، سرگیجه، تهوع، دردهای عضلانی، خارش و کمیر است که با مواد آنتی هیستامین و کورتن و اپی نفرین بر طرف خواهد شد. در ضمن، افرادی که به تخمر مرغ حساسیت دارند، نسبت به واكسن P.C.E.C که در سلول های فيبروبلاست جوجه کشت می شود حساسیت نشان می دهند.

واكسن مورد استفاده در ايران براساس مصوبه کمیته فنی، واكسنی است به نام Vero که غيرفعال² بوده و از کشت سویه 38-1508/WI 38-1508/WI 3M هاري در سلول Vero (حاصل از کلیه نوعی میمون) به دست می آید و به وسیله بتاپروپیولاتکن غیرفعال شده در ويال های تکذیب لیوفیلیزه همراه با ٥٠٠/٠ حلال از مريو فرانسه خريداري می شود. اين واكسن طی سال های زيادي که در ايران مصرف شده، هیچ گونه عارضه و يا واكسن سوئي نداشته است.

٨. تزريريق سرم و واكسن ضد کزار (توأم یا ثلث): با توجه به امكان ورود عامل بيماري کزار به علت جراحت ايجاد شده، استفاده از سرم و واكسن ضد کزار براساس آخرين دستورالعمل ايمان سازی کشور الزامي است.

٩. آنتی بيوتيك تراپي؛ علاوه بر شستشوی زخم و تزريريق واكسن و سرم های مزبور، به منظور پیشگیری از عفونت های ثانويه، تجويز آنتی بيوتيك مانند کوآموکسی کلاو یا هر آنتی بيوتيك دیگر تو سط پزشک ضروري است.^(۳)

١٠. تحت مراقبت قراردادن حیوان مهاجم؛ در صورتی که حیوان مهاجم، سگ یا گربه و در دسترس باشد، بايستی به مدت ١٠ روز آن را بسته و تحت نظر باشد. در این مدت نیز آب و غذاي کافی در اختیار حیوان قرار گیرد. در صورتی که طی این مدت، حیوان تلف شده و یا علائم هاري را نشان دهد، به احتمال زیاد به هاري مبتلا بوده و بايستی

1. Flury
2. Inactivated

واکسیناسیون ضد هاری را تا نوبت آخر جهت فرد حیوان گزیده انجام داد و نمونه بافت مغزی حیوان جهت آزمایش به انستیتو پاستور ایران ارسال گردد. در صورت عدم بروز علائم هاری و نمردن حیوان، در دوره تحت نظر، به طور قطع حیوان هار نیست و باید از ادامه واکسیناسیون شخص خودداری شود.

۱۱. نمونه برداری از حیوان مهاجم مشکوک؛ به منظور تشخیص بیماری هاری در حیوان مهاجم و مشکوک می‌توان از دو روش استفاده کرد:
 - کشتن حیوان مشکوک و ارسال سر آن به انستیتو پاستور ایران.
 - نمونه برداری از بافت مغز با استفاده از کیت‌های مخصوص نمونه برداری و ارسال به انستیتو پاستور ایران.
 توضیحات مفصل این دو روش در بخش تشخیص ارائه شده است.

نکته‌های مهم

۱. درمان پیشگیری کامل در مواردی انجام می‌شود که حیوان مهاجم یا از نظر ابلال به هاری مبتلا باشد یا متواتری شده و اگر سگ با گربه است، ۱۰ روز پس از گازگرفتن مرده یا علائم هاری در آن ظاهر شده باشد.
۲. درمان پیشگیری ناقص در مواردی انجام می‌شود که حیوان مهاجم یا از نظر ابتلا به هاری منفی باشد و اگر سگ یا گربه است، ۱۰ روز پس از تحت نظر قرار گرفتن سالم باشد.
۳. تمام موارد حیوان گزیدگی را بایستی مشکوک به هار گزیدگی تلقی نمود تا خلاف آن ثابت شود و اقدام‌های فوری درمان پیشگیری هاری را شروع کرد.
۴. در صورت تماس انسان با بزاق نشخوار کنندگان و تک‌سمی‌های مشکوک بایستی، درمان پیشگیری کامل، انجام شود.

- نکته‌های مهم و آخرین توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت و کمیته فنی کشوری هاری در درمان پیشگیری ضد هاری آسیب‌دیدگان حیوان گزیده:
۱. واکسن ضد هاری در بالغین حتماً باید در عضله دلتوئید بازو تزریق شود.
 ۲. واکسن ضد هاری در اطفال کمتر از دو سال حتماً باید در ناحیه بالا و قسمت جانبی ران تزریق گردد.
 ۳. واکسن ضد هاری باید در سرین تزریق شود.
 ۴. تمایز بین گازگرفتن از روی لباس و بدن عربان باید حذف و درمان پیشگیری هاری انجام شود.
 ۵. در صورت استفاده از سرم به جای واکسن، پس از فراهم شدن واکسن نوبت اول، باید آن را به دو یا سه دُز افزایش داده، در نقاط مختلف بدن تزریق نمود. در موارد ذیل، دُز اولیه واکسن را به دو برابر افزایش می‌دهند:
 - افراد حیوان گزیده مبتلا به یک بیماری مزمن (نظیر سیروروز کبدی)؛
 - افراد حیوان گزیده مبتلا به نقص ایمنی مادرزادی یا مبتلا به ایدز؛
 - افراد حیوان گزیده‌ای که داروهای اینتوسوپرسيو مانند کورتيکosteroidها یا داروی ضدمالاریا مصرف می‌کنند؛
 - افراد حیوان گزیده‌ای که گرفتار فقر غذایی هستند؛
 - افراد حیوان گزیده‌ای که باید هم واکسن و هم سرم تلقیح نمایند؛ اما سرم در دسترس نباشد؛
 - افراد حیوان گزیده‌ای که با تأخیر ۴۸ ساعت یا بیشتر برای درمان پیشگیری مراجعه کرده‌اند.
 ۶. براساس آخرین توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، آسیب‌دیدگان گازگرفته توسط جوندگانی مانند موش خانگی و صحرابی، و خرگوش به درمان پیشگیری نیازی ندارند؛ مگر در آینده که از طرف

انستیتو پاستور ایران گزارش‌های دیگری دال بر وجود بیماری هاری در این حیوان‌ها در ایران اعلام شود، البته درباره آسیب‌دیدگان گازگرفته توسط موش‌خرما و راسو درمان پیشگیری ضد هاری ضروری است.

۷. افرادی که قبلاً تحت درمان با واکسن کشت سلولی بوده‌اند؛ اگر دوباره توسط حیوانی گزیده‌شوند، درصورتی که فاصله واکسیناسیون قبلی و گازگرفته‌شدن فعلی وی کمتر از ۴ سال باشد، تزریق دو نوبت واکسن در روزهای صفر و ۳ الزامی است. اگر محل گازگرفتن ناحیه سر و صورت است و یا فاصله واکسیناسیون قبلی و گازگرفتن فعلی بیش از ۴ سال باشد، بایستی واکسیناسیون را دوباره شروع نمود.

۸. افرادی که واکسیناسیون کامل شده‌اند اگر دوباره توسط حیوانی گزیده‌شوند، تزریق سرم به آنان توصیه‌نمی‌گردد.

۹. افراد گازگرفته توسط سگ واکسینه به علت عدم اعتماد به اینمی و امکان انتقال بیماری هاری باید طبق دستورالعمل تحت درمان پیشگیری قرار گیرند.

﴿ واکسیناسیون کارکنان در معرض خطر هاری علیه این بیماری (ایمن‌سازی قبل از مواجهه)، نظیر دامپزشکان، تکنسین‌های دامپزشکی،

کارگران کشتارگاه‌ها، خدمهٔ باغ و حشن، شکارچیان، شکاربانان حفاظت محیط‌زیست، چوپانان، مسئولان هاری در مرکز بهداشت، کارکنان آزمایشگاه‌هایی که با ویروس هاری سروکار دارند، باید به یکی از دو روش زیر انجام شود:

۱. سه نوبت در روزهای صفر، ۲۱، ۷ یا ۲۸:

۲. سه نوبت در روزهای صفر، ۲۸، ۵۶. اگر مصنون‌سازی فوریت نداشته باشد.

در هر صورت، پس از اعمال هر یک از این دو روش، برای حفظ مصونیت، درصورت امکان اندازه گیری تیتر آنتی کر ضد هاری در خون، هر سال یکبار و تزریق یک نوبت واکسن، درصورت نقصان تیتر ضروری است. در غیر این صورت، باید هر ساله یک نوبت واکسن ضد هاری به عنوان یادآور

تزریق شود. در ضمن، اگر واکسیناسیون شخص به منظور مسافرت به مناطق آندمیک هاری انجام می‌شود، شروع مسافرت باید حداقل یک ماه بعد از تزریق سومین نوبت واکسن انجام پذیرد. در بعضی کشورها نظیر آمریکا برای ایمن‌سازی قبل از مواجهه، واکسن C.H.D.C را به مقدار ۱ml / ۰ به صورت بین جلدی یا ۱ml به صورت زیرجلدی در سه نوبت مذکور تزریق می‌نمایند. این روش مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت هم هست؛ ولی در کشور ما به دلایل مختلف و تکنیکی از این روش استفاده ننمی‌شود.

افراد در معرض خطر بیماری هاری باید در دورهٔ نهفته‌گی بیماری، دوران نقاوت از بیماری‌ها و هنگام استفاده از کورتیکوستروئیدها و داروهای ایمنوسوپرپرسیو از واکسیناسیون علیه بیماری هاری خودداری نمایند. در ضمن، واکسیناسیون افرادی که نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های همراه با واکسن (نظیر کلرتراسیکلین، استرپتومایسین، نئومایسین، آمفوتیریسین B) حساسیت‌دارند با احتیاط همراه باشد. برای کسانی که نسبت به پروتئین مرغی حساسیت دارند و برای زنان باردار از واکسن P.C.E.C نباید استفاده کرد و درصورت استفاده و بروز حساسیت، برای ادامه واکسیناسیون باید نوع H.D.C یا VERO را مصرف نمود.

﴿ تشخیص هاری در دو مرحله (قبل و بعد از ظهور علائم)

الف) مبانی تشخیص هاری قبل از ظهور علائم بالینی؛

ب) تشخیص هاری پس از ظهور علائم بیماری و مرگ.

الف) مبانی تشخیص هاری قبل از ظهور علائم بالینی

۱. تشخیص هاری در حیوان مهاجم به‌وسیله دامپزشک.

۲. تحت مراقبت قراردادن سگ با گربهٔ مهاجم به‌مدت ۱۰ روز. اگر حیوان تا زمان تزریق نوبت چهارم واکسن (روز چهاردهم) زنده‌ماند،

به‌طورقطعه هار نیست و باید از ادامه واکسیناسیون شخص آسیب‌دیده خودداری شود. البته در این مدت باید با رعایت جوانب احتیاط، آب و مواد غذایی در اختیار حیوان گذاشته شود تا از گرسنگی نمیرد.

5

کنترل و پیشگیری هاری در ایران

5

کنترل و پیشگیری هاری در ایران

۳. کشن حیوان مشکوک به هاری و ارسال سر حیوان به انسستیتوپاستور. بریدن سر حیوان باید بهوسیلهٔ مأموران دامپزشکی یا بهداشت با استفاده از وسایل کامل حفاظتی نظیر دستکش پلاستیکی، عینک، روپوش، پیش‌بند نایلونی ضخیم، چکمهٔ پلاستیکی و ماسک و با رعایت جوانب احتیاط انجام گیرد. باید سر بریدهٔ حیوان را در یک کیسهٔ نایلونی ضخیم غیرقابل نفوذ قرارداده و در کیسه را محکم بست. سپس آن را در یک یخدان پر از يخ گذاشت؛ زیرا اگر مغز حیوان در اثر گرمای فاسدشود، تشخیص را در انسستیتو پاستور با مشکلاتی مواجه می‌نماید. در ضمن، تمام مشخصات حیوان مهاجم، محل وقوع حادثه، تاریخ و مشخصات آسیب‌دیدگان را در یک نامه با سر حیوان باید به انسستیتو پاستور ایران فرستاد، و اگر حیوان با اسلحهٔ گرم کشته‌می‌شود، نباید به مغز حیوان شلیک کرد. در انسستیتو پاستور ایران از طریق آزمایش اینونفلورسانس چند ساعت پس از نمونه‌گیری، تشخیص قطعی هاری صورت می‌گیرد. سپس نتیجهٔ آزمایش را تلفنی به مرکز بهداشت مبدأ اطلاع می‌دهند، و در صورت محدود نبودن انجام آزمایش آزمایش‌های تكمیلی بعد از چند روز تشخیص قطعی داده خواهد شد.

۴. نمونه‌برداری از بافت مغز با استفاده از کیت‌های مخصوص نمونه‌برداری بهمنظور رفع مشکلات کیفی بسته‌بندی و زمان‌بندی ارسال سر حیوان به انسستیتو پاستور، با هماهنگی و توسط کارشناس دامپزشکی شهرستان می‌توان از بافت مغز و با استفاده از کیت‌های مخصوص، برای نمونه‌برداری و ارسال نمونه به انسستیتو پاستور اقدام نمود. از جمله مزایای این روش، بسته‌بندی و ارسال فوری و راحت‌تر نمونه از طریق پست است. مراحل مختلف نمونه‌برداری به این شرح است:

5

کنترل و پیشگیری هایی در اینجا

- قسمت کوچکی از بافت مغز را تا جایی که امکان دارد با فشاردادن نی پلاستیکی به داخل کاسهٔ سر در حد امکان از طریق حفرهٔ پس‌سری برداشت کنید؛
- در یکی از ویال‌های حاوی مایع نگهدارنده را باز کنید؛
- قسمت انتهایی نی پلاستیکی حاوی بافت برداشت شده را به داخل ویال مایع نگهدارنده وارد نموده، قسمت بالای آن را با قیچی بریده و آن را در مایع رها کنید (در عمل باید اطمینان یافته که نی پلاستیکی حاوی نسج مغزی باشد)؛
- به منظور رعایت مسائل ایمنی، در ویال را محکم بسته و دور آن را با نوار چسب به طور کامل پیوشناید؛
- شماره، تاریخ و مشخصات نمونه و فرستنده را روی ویال نمونه‌برداری یادداشت کنید؛
- از ویال دوم برای جمع‌آوری مجدد همان نمونه استفاده ننمایید؛
- هر دو ویال را در میان پنه و داخل کیسهٔ پلاستیکی زیپ‌دار بسته‌بندی نموده، اطلاعات مربوط را روی آن یادداشت ننمایید؛
- کیسهٔ پلاستیکی زیپ‌دار را در پاکت ضد ضربهٔ مخصوص بگذارید و نشانی دقیق آزمایشگاه و مشخصات فرستنده را روی آن یادداشت نموده، فوری از طریق پست سفارشی (پیش‌تاز) به انسستیتو پاستور ایران ارسال نمایید.
- لازم به توضیح است که برای انجام مراحل مذبور همیشه بایستی از دستکش استفاده ننمود و از تماس چشم و دهان با بافت‌های آلوده و ترشحات دهان حیوان پرهیز شود. در ضمن، پس از مراحل کار بایستی لوازم آلوده مانند قیچی را ضد عفونی نموده و دستکش‌ها را سوزاند.
- ب) تشخیص هاری پس از ظهور علائم بیماری و مرگ

سگ‌های ولگرد و در موقع خاصی از شب و با استفاده از اسلحه یا روش مناسب دیگری نسبت به کشن آنها اقدام می‌نمایند. از نظر زمان‌بندی بهتر است این کار در فصل آبستنی سگ، یعنی حداقل دو بار در سال، هر بار به مدت ۲ ماه (دوره آبستنی سگ حدود ۲ ماه است) به صورت زیر اجرا شود:

قبل از شروع برنامه باید از طریق رسانه‌های گروهی مردم با چگونگی برنامه و لزوم اجرای آن آشناشوند. در ضمن، آموزش بهداشت به روش‌های مختلفی مانند تبیه پوستر و پمپلت، همکاری مردم را جلب و شماره تلفن‌هایی را برای نظرخواهی و همکاری آنان اختصاص دهد.

برنامه نابودی سگ و گربه‌های ولگرد زمانی مؤثر است که به صورت یک برنامه هدف‌دار زمان‌بندی شده و مستمر، با اعتبارات کافی و حمایت مسئولان شهرستان بوده و به‌طور مکرر هم ارزیابی شود؛ در غیر این صورت، اجرای مقطوعی و موردي آن چندان تأثیری در کاهش جمعیت این حیوان‌ها نخواهد داشت.

۲. **جمع‌آوری و دفن بهداشتی زباله؛** تدوین این برنامه یکی از وظایف شورای بهداشت شهرستان و کارشناسان شهرداری است که درنهایت، موفقیت آن در گرو مشارکت و همکاری مردم با مأموران شهرداری‌ها و شوراهای بهداشت روزتاها است.

۳. **جلوگیری از کشتار قاچاق و غیرمجاز دام؛** در این مورد، شهرداری‌ها با کمک شبکه‌های دامپزشکی باید هماهنگی و اقدام لازم را انجام‌دهند.

۴. **بهداشتی کردن و انتقال کشتارگاه‌ها به خارج از محدوده شهرها؛** این کار توسط شهرداری‌ها با نظارت شبکه‌های دامپزشکی انجام می‌شود.

۵. **شناسایی و واکسیناسیون سگ خانگی و گله توسط اداره دامپزشکی؛** با توجه به این که درصد زیادی (۹۰٪ موارد) از حیوان‌گزیدگی‌ها در مناطق روزتایی توسط سگ‌های صاحب‌دار، سگ خانگی و گله انجام می‌شود، طرح موضوع در جلسه شورای بهداشت شهرستان به‌منظور انجام اقدام‌های لازم توسط دامپزشکی ضروری است. بدین‌گونه در صورت اجرای این اقدام‌ها، میزان بروز حیوان‌گزیدگی در حد

پس از ظهور علائم هاری و به‌منظور تشخیص قطعی بیماری در انسان پس از مرگ بایستی ضمن تماس تلفنی با بخش هاری انتیتو پاستور ایران، نمونه بافت معزی بیمار، تهیه و ارسال شود. لازم به توضیح است که به‌منظور همکاری بیشتر مسئولان بیمارستان و پزشکان بخش بهتر است با پژوهشی قانونی شهرستان نیز هماهنگی‌های لازم به عمل آید.

(ب) اقدام‌های سایر اداره‌های شهرستان‌ها
اقدام‌های مربوط به سایر اداره‌های شهرستان در جهت مبارزه با هاری عبارتند از:
۱. **تشکیل کمیته نابودی سگ و گربه‌های ولگرد در شهرستان؛** با توجه به نقش مهم سگ و گربه‌های ولگرد در انتقال بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان و از جمله بیماری هاری و با توجه به لزوم مبارزه جدی و قاطع به‌خصوص از طریق حذف یا نابودی آن‌ها، تشکیل کمیته نابودی سگ و گربه‌های ولگرد از اولویت خاصی برخوردار است. ریاست این کمیته را فرماندار یا نماینده تام‌الاختیار وی به‌عهده می‌گیرد و اعضای آن عبارتند از:

- شهردار یا نماینده تام‌الاختیار وی،
- معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان،
- کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها،
- کارشناس مسئول سلامت محیط و کار
- نماینده تام‌الاختیار نیروهای انتظامی،
- نماینده تام‌الاختیار دامپزشکی،
- نماینده تام‌الاختیار اداره مدیریت و برنامه‌ریزی شهرستان،
- این ستاد زیر نظر شورای بهداشت شهرستان و استان نسبت به تهیه برنامه اجرایی نابودی سگ‌ها و گربه‌های ولگرد شهرستان اقدام نموده، اکیپ‌هایی را با توجه به وسعت شهرستان و حاشیه شهر متشكل از نیروهای انتظامی، بهداشت محیط و شهرداری تشکیل داده، با شناسایی محل تجمع

۱. آموزش مردم در زمینه اهمیت بیماری، راههای سرایت و راههای جلوگیری از ابتلا به بیماری، راههای حفاظتی و تدافعی جهت جلوگیری از حیوان گزیدگی، اهمیت درمان پیشگیری بهموقوع؛ درصورت مراجعة فرد حیوان گزیده، شستشوی محل جراحت با آب و صابون؛
۲. ارجاع فوری مجروح به مرکز درمان پیشگیری شهرستان؛
۳. پیشگیری ادامه واکسیناسیون فرد و کنترل کارت واکسیناسیون هاری با توجیه و آموزش و راهنمایی فرد مجروح جهت ادامه واکسیناسیون در مرکز بهداشت شهرستان؛
۴. جلب همکاری و مشارکت مردم در بهسازی محیط و جمع آوری و دفن بهداشتی زباله‌ها؛
۵. ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مستقر در منطقه از قبیل شهرداری، دامپزشکی، محیط زیست، بخشداری و ... جهت انجام اقدامهای مربوط به بهسازی محیط و جمع آوری و دفن صحیح زباله، نابودی سگ‌های ولگرد و ...؛
۶. همکاری با مسئولان دامپزشکی در زمینه شناسایی، قلاده‌زن و واکسیناسیون سگ‌های خانگی و سگ گله علیه هاری؛
۷. خودداری از کشتارهای غیرمجاز دام.

(ب) خانه بهداشت

۱. آموزش چهره به چهره روستاییان و شوراهای بهداشتی درخصوص اهمیت بیماری هاری، راههای انتقال و جلوگیری از ابتلا، نقش درمان پیشگیری فوری در جلوگیری از ابتلا؛
۲. شستشوی محل جراحت فرد حیوان گزیده با آب و صابون و ارجاع فوری به مرکز درمان پیشگیری هاری شهرستان و آموزش وی در زمینه خطرهای بیماری و نقش درمان پیشگیری در جلوگیری از ابتلا به هاری؛
۳. پیشگیری ادامه واکسیناسیون علیه هاری در فرد مجروح و راهنمایی وی درصورت عدم مراجعة به موقع از طریق مرکز بهداشت شهرستان، پیشگیری‌ها باستی خیلی دقیق و جدی باشد و تا زمانی که ابتلای حیوان مهاجم به هاری منتفی نشده است، در هر صورت فرد حیوان گزیده نباید

5

کنترل و پیشگیری هایی در این راه

- قابل توجهی کاهش می‌یابد و از هدر رفتن ارز و بودجه هنگفت جهت خرید سرم و واکسن ضد هاری کاسته خواهد شد. در این مورد هماهنگی بین تمام مسئولان و همت و تلاش مسئولان دامپزشکی شهرستان و پشتیبانی از مرکز بسیار مهم و حائز اهمیت است.
۶. پرداخت غرامت به صاحبان دام‌های آلوده؛ مطابق آین نامه‌های مربوط، این بخش از اقدام‌ها نیز از وظایف شبکه دامپزشکی است.
 ۷. ایجاد اماکن محفوظ برای نگهداری دام در مقابل حیوان‌های وحشی؛ از طریق ارائه آموزش‌ها توسط شبکه دامپزشکی شهرستان، مردم را باید از خطر انتقال بیماری از طریق حیوان‌های وحشی به دام آگاه‌ساخت، و همکاری آنان را درخصوص ایجاد اماکن محفوظ برای دام جلب‌نمود.
 ۸. پیشگیری از بیماری هاری وحشی؛ برای پیشگیری و کاهش میزان بروز بیماری هاری در حیات وحش اقدام‌های مختلفی از قبیل اتلاف حیوانات مشکوک به هاری و واکسیناسیون هاری در وحش می‌توان انجام داد که باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست و مطابق آخرین دستورالعمل‌های موجود و تجربیات سایر کشورها در این زمینه و با همکاری دامپزشکی و نهادهای انتظامی انجام‌پذیرد.

5

کنترل و پیشگیری هایی در این راه

۴. سطح محیطی (مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری و خانه‌های بهداشت) با توجه به اهمیت بیماری هاری و حساسیت درمان پیشگیری و درصد کشنده‌گی بالای بیماری، مشکلات تهیه واکسن و سرم ضد هاری انسانی، گران‌بودن آن‌ها و ... و با توجه به شرایط موجود در سطح کشور، همه وظایف درمان پیشگیری هاری را نمی‌توان به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی محول نمود، و رئوس وظایف هر سطح به شرح زیر است:
- الف) وظایف مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری

راهنمای کشوری مبارزه با هاری

- رهاگردد و به طور جدی تا تعیین تکلیف و تکمیل برنامه واکسیناسیون از وضعیت وی مراقبت و پیگیری شود؛
۴. آموزش دامداران و روستاییان درخصوص همکاری با مسئولان دامپزشکی در زمینه شناسایی و قلاده‌زدن و واکسینه‌نمودن سگ‌های خانگی و سگ گله علیه هاری؛
 ۵. جلب همکاری و مشارکت مردم در زمینه جمع‌آوری و دفن صحیح زباله؛
 ۶. خودداری از کشتارهای غیرمجاز دام.

راهنمای درمان پیشگیری ضد هاری پس از مواجهه

نوع تماس با حیوان اهلی یا وحشی مشکوک یا مبتلا به هاری یا حیوان‌های دور از دسترس برای بررسی	روش درمان پیشگیری
I	تماس از طریق غذادادن به حیوان‌ها، و لیسیدن پوست سالم
II	تندان‌زدن پوست برنه، خراش‌های کوچک یا ساییدگی‌های بدون خونریزی، و لیسیدن زخم
III	یک با چند بار حیوان‌گزیدگی یا خراش‌های عمیق جلدی یا آلوده شدن غشاء مخاط با بزرگ (لیسیدن)

* در آلدگی بهوسیله جوندگان و خرگوش صحرائی، درمان ضد هاری به ندرت ضرورت می‌باشد.

** دوره تحتنظربودن فقط برای سگ و گربه کاربرد دارد؛ جز مواردی که حیوان تهدیدشده و در معرض خطر باشد، سایر حیوان‌های اهلی و وحشی مشکوک به هاری باید به گونه مناسبی کشته شوند و به روش‌های اختصاصی هاری بافت‌های آن‌ها آزمایش گردد.

اقتباس از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت

منابع

۱. صائبی، اسماعیل؛ بیماری‌های عفونی در ایران.(بیماری‌های ویروسی):
ص ۵۷۳ چاپ سوم(۱۳۷۲).
۲. عزیزی فریدون، حاتمی حسین، جانوربانی محسن؛ پیدمیولوژی و
کنترل بیماری‌های واگیر شایع در ایران؛ انتشارات مرکز تحقیقات عدد
درون‌ریز و متabolism دانشگاه علوم پزشکی تهران، صص ۵۴۷-۵۴۹
چاپ اول(۱۳۷۹).
3. Drazen Gill, Griggs Kokko, Mandel, *Cecil Text book of medicine*; 21 St Edition Vol. 3; 2000, P.2133.
4. Richard L.Gvarrant, David H. Walker, Peter F.Weller, Churchill
Livingston; *Essentials of tropical infectious disease*; 2001, P. 592.
5. Mandell, Douglas, Bennett, s Principle and practice of infectious
disease, fifth edition, Vol. 3&5; 2000, P. 1813-1819, 3203.
6. Centre for Disease Control and Prevention Division of viral and
Rickettsial Diseases, <http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/rabies>.

راهنمای کشوری مبارزه با هاری

راهنمای کشوری مبارزه با هاری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش	فرم بررسی امنیتی درمانی شهری
پژوهشگاه دانشکده علوم پزشکی	پژوهشگاه دانشکده علوم پزشکی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی روسایی	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
خانه بهداشت	خانه بهداشت
تیم سیار	تاریخ تبیه فرم
نام خانوادگی:	نام پدر:
ملیت:	سن:
میزان سواد:	شغل:
نشانی محل سکونت:	نشانی محل تهاجم:
جیوان مهاجم:	وضعیت جیوان مهاجم:
تاریخ حادثه:	تاریخ بروز عالم:
منبع گزارش:	تعداد و نحوه ضایعات ایجاد شده:
عضو آسیبدیده:	تاریخ مراجعة به پزشک:
علائم بالینی:	تاریخ فوت:
نتایج آزمایش‌های تشخیصی با ذکر محل آزمایش:	
بررسی همه گیری شناسی	
— سابقه حیوان گزیدگی در فرد:	
— سابقه واکسیناسیون و سرم‌ترابی در فرد با ذکر تعداد و نوبت:	
— سابقه واکسیناسیون حیوان مهاجم با ذکر تعداد و نوبت:	

اصدام‌های پیگیری	نتیجه آزمایشگاهی نمونه حیوان مهاجم:	اصدام‌های درمان پیشگیری بیماری در فرد گزیده:

تلقيق سرم ضد هاري (ایمنو گلوبولین اختصاصي انساني)	شماره سریال	تاریخ انقضا	تاریخ تزریق	مقدار تجویز شده	محل تزریق

اقدام‌های پیگیری اطرافیان فرد حیوان گزیده:

امضا و شماره نظام پزشکی	نام پزشک بررسی کننده:	تاریخ بررسی:
نظریه اپدمیولوژیست یا کارشناس مسئول مبارزه با بیماری‌های استان:		

۵ فرم گزارش مهندسی اطلاعات مبارزه با هاری

۵

متغیرها	منطقه و نوع حیوان مهاجم						تعداد موارد	تعداد و نوع حیوان مهاجم	
	شهری	روستایی	سگ	گربه	گرگ	شغال	روبا	اهلی وحشی	غیره
۱ کامل (۵ نوبتی)									
۲ مجزوحان نیازمند به درمان ناقص (۳ نوبتی)									
۳ مجزوحان درمان نشده									
۴ مجزوحان قبل از گزیدگی (Pre exposure)									
۵ نمونه‌های مشکوک از مایش شده از حیوانات مهاجم									
۶ نمونه‌های مثبت حیوانی موارد هاری انسانی									
۷ تعداد سگ‌های ولترد تلف شده در ماه									
۸ تعداد کل گازگرفتن توسط سگ‌های صاحب‌دار (خانگی و گله)									
۹ تعداد کل گازگرفتن توسط سگ‌های ولگرد									

ایرانی	افقانی	عراقی	پاکستانی	سایر	جمع کل

وضعیت سرم و واکسن ضد هاری	موحدودی قبل	موحدودی این ماه	صرفی این ماه	درايفتی این ماه	واکسن ضد هاری (ذرا)	سرم ضد هاری (واحد)	کارشناس مسئول پیشگیری و مراقبت بیماری‌های شهرستان / استان:
							امضا: تاریخ تنظیم:

منظور از مجزوحان نیازمند به درمان کامل افرادی هستند که حیوان مهاجم آنها از نظر هاری مثبت بوده با متواتری شده و یا تا ۱۰ روز پس از گازگرفتن فرد در در مرود سگ و گربه در اثر هاری از بین می‌رود و بایستی برای این افراد یک دوره واکسیناسیون کامل (در ۵ نوبت) انجام شود. افراد نیازمند به درمان کامل به محض مشخص شدن وضعیت در همان ماه گزارش می‌شوند و در صورتی که هنوز وضعیت درمان آنها مشخص نشده می‌توان در آمار ماه بعدی آنها را منظور نمود. تاکیدمی‌شود که هر مرد از مجزوحان نیازمند به درمان کامل با نقص فقط باستی در یک ماه گزارش شوند و از تکرار آن در دو ماه خودداری شون.	در ردیف‌های ۱ و ۲ و ۳ ستون تعداد و نوع حیوان مهاجم (سگ) جمع تعداد آنها می‌بایستی با ردیف‌های ۹ و ۱۰ تعداد کل گازگرفتن توسط سگ‌های صاحب‌دار و بدون صاحب (شهری و روستایی) هم‌خواهن داشته باشد. جمع ردیف‌های ۱ و ۲ و ۳ مجزوحان نیازمند به درمان کامل، ناقص و شده شهری و روستایی) می‌بایستی با جمع کل در جدول ملیت افراد مجزوحان بر حسب تعداد هم‌خواهی داشته باشد. در جدول مربوط به سرم و واکسن ضد هاری باستی کسر ستون «صرفی این ماه» «از جمع دو ستون» موجودی قبل و دریافتی این ماه با ستون «موجودی قفلی» برابر در تصریف گرفته شده و برای موجودی قبل در ماه آینده هم منظور گردد.
یک نسخه از این فرم در مرکز پیداشرت شهرستان و یک نسخه به مرکز پیداشرت استان، و پس از جمع بندی از مرکز پیداشرت استان به مرکز مدیریت بیماری‌ها ارسال گردد.	

+

راهنمای کشوري مبارزه با هاري

یک نسخه از این فرم در مرکز بهداشت شهرستان تکهداری و نسخه بعدی به مرکز بهداشت استان و سپس به مرکز مدیریت بیماری‌ها ارسال می‌گردد.

5

نما

+

نمونه دفتر پیگیری موارد حیوان گزیده
..... شماره:
..... معاونت پداسنی دانشگاه علوم پزشکی:
..... مرکز پداسنی شهرستان: تاریخ:

جدول واکسیناسیون هاری							نام: نام خانوادگی: نام: نام پدر: سن: وزن: جنس: شغل: نشانی منزل: نشانی محل کار:						
پنجم	چهارم	سوم	دوم	اول	نوبت	واکسن هاری	تلفن منزل:	تلفن محل کار:	استان: شعبه: ساعت: بخش: تاریخ: پلاک:	استان: شهرستان: ساعت: بخش: تاریخ: پلاک:			
۳۰	۱۴	۷	۳	صفر	روز تزریق								
					تاریخ تزریق								
					شماره سریال								
آیا مجروح ساقه و واکسیناسیون هاری قبلی دارد؟ بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>							محل و تاریخ وقوع حادثه						
اگر بله در صورت امکان تعداد دفعات تاریخ آخرین تزریق							خیابان: روستا: شعبه: ساعت: بخش: تاریخ: پلاک:						
یادآور	دوم	اول	نوبت	** واکسن کراز یا تؤام با ثالث	** سرم ضد کراز	نوع و سرنوشت حیوان مهاجم							
			تاریخ تزریق			نوع وحشی <input type="checkbox"/> اهلی <input type="checkbox"/> ولگرد <input type="checkbox"/> تحت نظر <input type="checkbox"/> متواتر <input type="checkbox"/> کشته نوع و نتیجه آزمایش حیوان مهاجم							
وضعیت حیوان مهاجم تحت نظر بعد از ۱۰ روز (فقط در مورد سگ و گربه)	یک نوبت	نوبت	روز تزریق	نوع سرم	مقدار تزریق	چگونگی جراحات							
							وسعت: تعداد: محل: سطحی: عمیق: عربان: از روی لیسان: شرایط مقدماتی						
						شستشو با آب خالص: شستشو با آب صابون: پانسمان: بخیه*: تجویز آنتی بیوتیک:							
						تاریخ شروع: روز: مدت تأثیر: نوع و اکسن هاری: واکشن: محل تزریق: شماره سریال: ساعت: تأخیر: مقدار تزریق: نوع سرم هاری: واکشن: مقدار تزریق: واکشن:							

* بخیه محل حیوان گزیدگی مطابق دستورالعمل منمنع است: مگر در موارد اجتناب ناپذیر.

5

** در مورد تزریق سرم و واکسن ضد کراز مطابق دستورالعمل و جدول ایمنسازی کشوری اقدام شود.

نمونه کارت درمان پیشگیری هاری

روی کارت

پشت کارت

نوبت واکسن ضد هاری	اول روز صفر	دوم روز ۳	سوم روز ۷	چهارم روز ۱۴	پنجم روز ۳۰
تاریخ تزریق واکسن					
نوبت واکسن کزارز یا توأم یا ٹلث	اول	دوم	یادآور	یادآور	یادآور
تاریخ تزریق واکسن					

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

مرکز بهداشت

مرکز درمان پیشگیری هاری

نام پدر:

نام خانوادگی:

نام:

تاریخ شروع درمان:

نام:

سن:

تاریخ حیوان گزیدگی:

با تزریق به موقع واکسن ضد هاری خود را از ابتلا به این بیماری مهلهک و
صددرصد کشنده نجات دهید.

آذر

تاریخ تزریق سرم ضد هاری: مقدار تزریق سرم ضد هاری
تاریخ تزریق سرم ضد کزارز: نوع و مقدار تزریق سرم ضد کزارز

5